

# Gynäkologie



- Vergleich von histologischen Befunden nach Eizelltransplantationen
- Zwangssterilisationen zwischen 1932 – 1940 - Beschreibung der Operationstechniken, soziokulturelle Faktoren und des Patientenkollektivs
- Vergleich von angewandten Therapieverfahren beim prämenstruellen Syndrom
- Risikofaktoren für die Gynäkomastie beim Mann (2)
- Auslösende Faktoren zur Entwicklung der Gynäkomastie des Mannes
- Etablierung neuer Tumormarker bei Patientinnen mit Mamma-Ca im klinischen Alltag
- Sensitivität und Spezifität der Thermographie zur Diagnostik des Mamma-Ca
- Vergleich der Sensitivität und Spezifität der Thermographie zur Diagnostik des Mamma-Ca – eine Folgestudie
- Vorhersagewerte der Tomosynthese als Screeningmethode des Mamma-Ca
- Sensitivität und Spezifität der Expression von M2-PK, pAKt, ER und PR beim Mamma-Ca
- Einsatzmöglichkeit des MRT bei Mamma-Karzinomen mit verschiedenen histologischen Typen – Bedeutung des relativen Wassergehaltes der Gewebe
- Survivalanalyse bei Patientinnen mit Mamma-Ca
- Outcome bei Patientinnen mit triple negativem Mamma-Ca
- Sensitivität und Spezifität der Thermographie beim Mamma-Ca – Vergleich der prognostischen Aussagekraft im Vergleich zur Mammographie – eine Folgestudie
- Mikro- und Makrokalk bei Patientinnen mit benignen vs. malignen Mammatumoren - diagnostische Wertigkeit von Mammographien
- Prognostische Wertigkeit von feingranulärem und grobgranulärem Kalk bezüglich des Mamma-Ca
- Prävalenz und Vorhersagewerte von Kalkansammlungen bezüglich des Mamma-Ca bei Patientinnen über bzw. unter 70 Jahren
- Methodenvergleich zur Volumenbestimmung von Mammae – Scan vs. Differenzmethode vs. Verdrängungsmethode
- HADS-Score und Cortisolverläufe beim fortgeschrittenem Mamma-Ca
- Vergleich adjuvanter Therapien bei metastasiertem Mamma-Ca – Einfluss auf die Symptomatik und die Lebensqualität
- Einfluss alternativer Heilverfahren auf die Lebensqualität beim metastasierten Mamma-Ca
- Zytologische Ergebnisse bei Vorsorgeuntersuchungen des Cervix-Ca – eine Analyse von 7000 Befunden
- Vergleich der alleinigen Sentinel-Lymphknoten-Biopsie versus der Axillakomplettierung bei Tumorbefall des Sentinel-Lymphknotens bei PatientInnen mit invasiven Mammakarzinom
- Validierung neuer Tumormarker beim Ovarial- Ca
- Mortalität und Progress bei Ovarial-Karzinomen - Vorhersagewerte des CA-125
- Wertigkeit neuer Tumormarker beim Uterus- Ca hinsichtlich des Screenings sowie als prognostische Parameter im Langzeitverlauf
- Einfluss des Operationsverfahrens und des präoperativen Hormonstatus auf die Rezidivrate und die Mortalität beim Uterus-Ca
- Vergleich des Outcome beim Uterus- Ca bei Patientinnen mit vs. ohne Radiatio – in welchen Stadien hat die Radiatio einen Benefit?
- Erfassung von Angst und Depression durch die HADS-Skala beim Zervix-Ca im Verlauf – welchen

Einfluss haben verschiedene Therapien auf die Angst und Depression?

- Zytologische Befunde bei Vorsorgeuntersuchungen der Frau – eine konsekutive Langzeiterhebung über 10 Jahre
- Prognostische Wertigkeit von Biomarkern bei zytologischen Befunden
- Einflussfaktoren auf LSIL im Langzeitverlauf
- Sensitivität und Spezifität von zytologischen Vorsorgeuntersuchungen
- Vorhersagewerte beim High Risk HPV bei verschiedenen zytologischen Befunden
- Inzidenz pathologischer HPV-Befunde in der Schwangerschaft
- Prognostische Wertigkeit von Papanicolaou IIID in Ausstrichpräparaten im Langzeitverlauf
- Risikofaktoren für einen Descensus uteri sowie postoperative Prognosefaktoren
- Langzeitverläufe und Sexualität nach operativer Behandlung des Descensus uteri
- Inkontinenz nach Hysterektomie – Risikofaktoren, Behandlung und Verlauf
- Prädisponierende Faktoren für vordere, mittlere und hintere Kompartimentinsuffizienzen nach Hysterektomien
- Schmerzverlauf nach Hysterektomien nach Aufrechterhaltung eines Pneumoperitoneums – Vergleich verschiedener OP-Methoden
- Vergleich von Hysterektomie in zwei Zeitintervallen – Veränderungen in Operationstechniken, Patientenklientelen und postoperativen Verläufen
- Einfluss von klimakterischen Beschwerden auf die Lebensqualität (MRS II, EORTC)
- Dyspareunie nach abdominellen und gynäkologischen Operationen – Prävalenz, Ursachen und Beeinträchtigung der Lebensqualität

[nach oben](#)

## Geburtshilfe



- Risikofaktoren für höhergradige Dammrisse während der Geburt
- Komplikationen durch PDA bei Nullipara, Primipara und Multipara
- Risikogeburten mit Sectio: Häufigkeit, Änderungen im Management in den letzten 20 Jahren sowie Identifizierung von Risikofaktoren
- Einflussfaktoren auf die Erfolgsraten in der Infertilitätsbehandlung
- Vergleich des Erfolges verschiedener Therapien bei Patientinnen mit Kinderwunsch sowie Sensitivität und Spezifität verschiedener Marker zur Früherkennung der Schwangerschaft
- Polymorphismen des Gerinnungssystems als Risikofaktoren für habituelle Aborte
- Risikofaktoren für Totgeburten und Aborte – Analyse regionaler Unterschiede und sozioökonomischer Faktoren
- Kenntnisstand praktizierender Gynäkolog/innen bezüglich Risiken und Prävention einer Präeklampsie
- Prognostische Bedeutung des Tryptophanspiegels bei Präemklampsie und HELLP
- IDO als Marker der Plazentainsuffizienz

- Einfluss von Interleukinen und mikrobiologischem Befund auf die Frühgeburtlichkeit
- Fibronectin und andere Labormarker als Tests zur Risikoevaluierung der Frühgeburtlichkeit
- Habituelle Aborte ohne und mit Behandlung von niedermolekularen Heparinen
- Vergleich mehrerer Therapieregime mit niedermolekularem Heparin zur Behandlung von Patientinnen mit habituellen Aborten
- Verbesserung der Abortrate bei Patientinnen mit habituellen Aborten durch die Gabe von niedermolekularem Heparin – eine retrospektive Analyse der Zweitbehandlung
- Validierung eines neuen Messverfahrens der Endotheldysfunktion zur Früherkennung von schwangeren Patientinnen mit Präeklampsie
- Mutationen des MMP 2, 7 und 9 sowie GPX5 und NOX5 und Expression von housekeeping Genen in der Plazenta
- Wundscores und Schmerzempfindlichkeit der postpartalen Mastitis bei verschiedenen Therapieansätzen
- Analyse des Stillverhaltens von Müttern aus verschiedenen Kulturkreisen

[nach oben](#)