


Dermatologie



- Reduzierung der Unterhautfettschicht durch topische Anwendung von lipolytischen Wirkstoffen
- Risikofaktoren für die Lipodystrophie bei HIV-Patienten und Berücksichtigung von genetischen Faktoren
- Vergleich von histochemischen Färbungen beim malignen Melanom – welche Färbung ist am besten geeignet?
- Diagnostische Wertigkeit von mikroskopischen Grauwertmessungen bei verschiedenen Hauttumoren
- Determinanten des Überlebens beim Malignen Melanom – eine 10-Jahres-Analyse
- Sensitivität und Spezifität der Dermatoskopie bei melanozytären Nävi und malignen Melanomen
- Vergleich der prognostischen Aussagekraft mehrerer Tumormarker beim malignen Melanom
- Prädiktiver Wert des Su-Par beim malignen Melanom – eine Modellentwicklung unter Kombination von Prognoseparametern
- Outcome beim Basalzell-Ca – eine Multicenterstudie mit 2000 Patienten
- Inzidenz des malignen Melanoms von 1979 – 2003. Beschreibung der Änderung der Lokalisation, der histologischen Subtypen und der Patientencharakteristika
- Sensitivität und Spezifität von Antikörpern bei Dermatomyositis und Polymyositis
- Nachweis von Auto-Antikörpern bei Patienten mit Kollagenosen und nichtrheumatischen inflammatorischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Arzneimittelexanthemen
- Erfolgsraten der Hyposensibilisierung bei Patienten mit anaphylaktischen Reaktionen nach Wespenstichen
- Vergleich von verschiedenen Behandlungsverfahren beim Morbus Osler
- Prospektive Studie bei Patientinnen mit Lipödem und Behandlung mit Liposuktion
- Wissensstand zur Diagnostik und Therapie des Lipödem bei Lymphtherapeuten
- Vergleich von Behandlungen des Lipödems bei verschiedenen Berufsgruppen
- 6-Monats-Ergebnisse nach der Liposuktion bei Patientinnen mit Lipödem
- Langzeitergebnisse nach der Liposuktion bei Patientinnen mit Lipödem
- Definierung neuer Messverfahren zur Bestimmung der Körpermaße bei Patientinnen mit Lipödem
- Lebensqualität nach Liposuktion bei Patientinnen mit Lipödem
- Die Prävalenz und klinischen Symptome des Lipödems in der hausärztlichen Praxis
- Venöse und lymphologische Erkrankungen der unteren Extremität bei Frauen – eine epidemiologische Erhebung bei 1000 Frauen
- Coriumdicke vor und nach KPE bei Patientinnen mit Lymphödem
- Kann bei hypomobilen Patienten in der KPE Phase 2 exakt druckgesteuerte intermittierende pneumatische 12-Kammer-Kompression mit gleichzeitigem Tragen von Kompressionsprofilinlays bei der Anwendung die lymphostatische Fibrosklerose besser reduzieren als die gleiche Therapie ohne diese Inlays?
- Prävalenz der Varikosis in der hausärztlichen Praxis – eine Bestandsaufnahme und Evaluation verschiedener Therapieregime
- Verbesserung der psychischen und körperlichen Gesundheit durch Haartransplantation

[nach oben](#)